

Apuntes básicos para diferenciar entre si los géneros Camponotus (Mayr, 1861)
y Formica (Linnaeus, 1758), (Hymenóptera, Formicidae)

Basic notes to differentiate genera Camponotus (Mayr, 1861) and Formica (Linnaeus,
1758), (Hymenoptera, Formicidae)

Autor: Javier Arcos, C/Médico Vicente Reyes, 18. C.P. 03015 Alicante, (España). Asociación Ibérica de Mirmecología
javier.arcos@e-campus.uab.cat

Edición: José Alberto Fernández. C/Chipre 1,6, 2ºB, 19005, Guadalajara, (España). Asociación ibérica de Mirmecología
ixdeenero@yahoo.es

1. Tórax abombado, sin sutura mesopropodeal (perfil del tórax continuo). Algunos pelos muy largos en el tórax.....*Camponotus*

-- Tórax no abombado, con sutura mesopropodeal (tórax con forma de dos jorobas).....2



Tórax abombado.

Camponotus.



Tórax con dos "jorobas".

2. Pelos muy largos y escasos en el tórax.....*Camponotus*

-- Pelos ausentes en el tórax o relativamente cortos (generalmente en el pronoto).....*Formica*



Pelos largos en el tórax. *Camponotus*.

Pelos ausentes o muy cortos en el tórax. *Formica*.

