

Apuntes básicos para diferenciar entre si los géneros Tetramorium (Mayr, 1855)  
y Pheidole (Westwood, 1839), (Hymenóptera, Formicidae)

Basic notes to differentiate genera Tetramorium (Mayr, 1855) and Pheidole (Westwood,  
1839), (Hymenoptera, Formicidae)

Autor: Javier Arcos, C/Médico Vicente Reyes, 18. C.P. 03015 Alicante, (España). Asociación Ibérica de Mirmecología  
[javier.arcos@e-campus.uab.cat](mailto:javier.arcos@e-campus.uab.cat)

Edición: José Alberto Fernández. C/Chipre 1,6, 2ºB, 19005, Guadalajara, (España). Asociación ibérica de Mirmecología  
[ixdeenero@yahoo.es](mailto:ixdeenero@yahoo.es)

**Obreras:**

Peciolo acabado en punta en vista lateral.....Pheidole (major y minor)

Peciolo plano (truncado) en vista lateral.....Tetramorium



Pheidole



Tetramorium

**Reinas:**

Escudo y cabeza con muchas estrías en vista dorsal (aspecto mate).....Tetramorium

Escudo y cabeza completamente lisos y brillantes.....Pheidole



Tetramorium



Pheidole